

RETENÇÃO PROLONGADA DE MOLAR DECÍDUO.

STÉPHANIE MONTEIRO FOGGIATTO SILVEIRA, LETÍCIA DE SANTA CLARA, LETÍCIA WAMBIER PROFESSORA ORIENTADORA.

¹ Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais
STÉPHANIE MONTEIRO FOGGIATTO SILVEIRA

² Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais
LETÍCIA DE SANTA CLARA

⁵ Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais
LETÍCIA WAMBIER, PROFESSORA ORIENTADORA

RESUMO: Os dentes decíduos possuem uma cronologia de erupção e esfoliação. A retenção prolongada acontece quando o dente decíduo permanece na cavidade oral por um período maior, e o dente permanente já deveria ter erupcionado em seu lugar. Pode ocorrer desse dente decíduo com retenção prolongada impedir a erupção do elemento permanente, como acontecer de erupcionar o dente permanente em um local distinto, e o decíduo continuar em boca sem esfoliar, em ambos os casos o tratamento seria a exodontia do elemento decíduo com retenção prolongada, o qual foi o tratamento relatado neste trabalho.

Concluindo que, para um correto diagnóstico sempre é necessário um bom exame clínico e radiográfico, onde também conseguirmos observar se não há agenesia dentária por exemplo.

Este trabalho tem por objetivo o relato de um caso clínico de um paciente A.B.Z de 11 anos de idade, sexo masculino, com a queixa principal por parte da mãe ao procurar o atendimento para avaliação de uma retenção prolongada de dente decíduo.

(PALAVRAS-CHAVE – retenção prolongada, exodontia, dente decíduo, cronologia).

ABSTRACT: Primary teeth have a chronology of eruption and exfoliation. Prolonged retention occurs when the deciduous tooth remains in the oral cavity for a longer period, and the permanent tooth should have already erupted in its place. It may occur that a deciduous tooth with prolonged retention prevents the eruption of the permanent element, such as the permanent tooth erupting in a different location, and the deciduous tooth remaining in the mouth without exfoliating, in both cases the treatment

would be the extraction of the deciduous element with retention prolonged, which was the treatment reported in this work.

In conclusion, for a correct diagnosis, a good clinical and radiographic examination is always necessary, where we can also observe whether there is tooth agenesis, for example.

This work aims to report a clinical case of an 11-year-old male A.B.Z patient, with the mother's main complaint when seeking care to evaluate a prolonged retention of a deciduous tooth.

(KEYWORDS - prolonged retention, extraction, deciduous tooth, chronology).

INTRODUÇÃO

No decorrer da transição da dentição decídua para permanente ocorre o processo de reabsorção dos dentes decíduos e o desenvolvimento dos dentes permanentes, que na erupção são levados até um posicionamento correto. Porém alguns fatores etiológicos, locais, e sistêmicos, podem causar a retenção prolongada dos dentes decíduos, influenciando na continuação da erupção dos dentes permanentes e no seu posicionamento. Por tanto, o diagnóstico e a intervenção precoce são essenciais.

O processo fisiológico de reabsorção das raízes dos dentes decíduos se chama rizólise. Caso a reabsorção radicular dos decíduos não aconteça de maneira uniforme e adequada, pode ocorrer a retenção prolongada destes elementos, com conseqüente atraso na erupção, e neste caso torna-se necessário a intervenção do cirurgião-dentista. (Bellão, A. F., Robim, L. E. C., Moreti, L. C. T., Sakashita, M. S., & Cruz, M. C. C. da. (2018)).

O objetivo do nosso trabalho é mostrar o significado, o motivo pelo qual acontece, métodos de diagnóstico, implicações clínicas e tratamento indicado. Vamos relacionar o trabalho com um caso clínico de retenção prolongada em dentes decíduos.

CASO CLÍNICO

Paciente A.B.Z de 11 anos de idade, sexo masculino, procurou a clínica de odontologia com queixa principal de retenção prolongada do dente 54.

Após anamnese e a avaliação clínica e radiográfica, foi organizada a intervenção cirúrgica.

Para o procedimento da cirurgia, deve ser realizada a técnica anestésica infiltrativa com lidocaína 2%.

E Após a extração, deve ser feito acompanhamento pós-cirúrgico, acompanhar para garantir que o elemento 14 entre em posição e ocupe o espaço que foi liberado pelo elemento 54 extraído.



Figura 1. Elemento 54 com retenção prolongada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conclui-se que o diagnóstico, na maioria dos casos de retenção prolongada dos dentes decíduos leva a intervenção cirúrgica, com a exodontia dos elementos retidos, seguida da manutenção de espaço e controle clínico e radiográfico até a erupção dos sucessores, sendo o tratamento adequado para impedir a impactação dos dentes permanentes.

A exodontia pode ou não ser seguida de um aparelho para manutenção do espaço, e controle até a total erupção dos permanentes. (Bellão, A. F., Robim, L. E. C., Moreti, L. C. T., Sakashita, M. S., & Cruz, M. C. C. da. (2018)).

CONCLUSÕES

Baseado nas literaturas consultadas, artigos, e no caso clínico relatado, percebe-se que o diagnóstico de retenção prolongada dos dentes decíduos geralmente leva a intervenção cirúrgica com a exodontia dos elementos, é o tratamento condizente para impedir a impactação dos dentes permanentes.

Devemos acompanhar após a exodontia, se o dente permanente retornará e ocupará o espaço, ou deverá ser corrigida a posição com aparelhos ortodônticos.

REFERÊNCIAS

Bellão, A. F., Robim, L. E. C., Moreti, L. C. T., Sakashita, M. S., & Cruz, M. C. C. da. (2018). P 007 - Retenção prolongada de dentes decíduos: relato de caso. *ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION*, 6. Recuperado de <https://archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/2819>

<https://archhealthinvestigation.emnuvens.com.br/ArcHI/article/view/2819>

<https://www.odontopediatriabrasil.com.br/esfoliacao-dos-dentes-decíduos/>

CARRENÕ B, et al. Cronología de la erupción dentaria em un grupo de mestizos caucasoides de Cali (Colombia). *Revista de Estomatologia*, 2017; 25(1): 16-22.

<https://www.portalped.com.br/outras-especialidades/odontopediatria/atrasos-na-erupcao-dentaria-o-que-os-cause-e-como-proceder/>.